

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 26-6-70 079233

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative — 67 - STRASBOURG

Tél. 34-14-63 = Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

C.C.P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67 - STRASBOURG

Supplément N° 4 au bulletin du mois de juin 1970.

23 juin 1970

/ Avertissement /

H O U B L O N

MILDIOU

Bien que les manifestations de cette maladie restent pratiquement inexistantes pour l'instant dans les houblonnières protégées selon nos indications, le temps humide et chaud que nous traversons est particulièrement favorable au développement du Mildiou du houblon.

Un nouveau traitement devra être exécuté dès réception de la présente note.

PUCERONS

Surveiller le développement des colonies et intervenir en cas de nécessité.

Signalons que l'emploi du Diméfox est interdit pendant les 60 jours qui précèdent la récolte. Aussi, les houblonniers qui désirent encore utiliser ce produit devront l'appliquer dans les prochains jours.

/ Information /

GRANDES CULTURES

POMMES DE TERRE

DORYPHORE

Des éclosions en nombre limité sont observées depuis quelques jours.

Dans les parcelles intéressées par ce ravageur prévoir une application insecticide lorsque les larves auront la grosseur d'un grain de blé. Choisir l'un des produits figurant sur la liste en votre possession.

En cas de traitement en volume réduit, avoir soin d'apporter la quantité de produit nécessaire à l'hectare.

ARBRES FRUITIERS A NOYAU

ANTHRACNOSE DU CERISIER

Ce champignon trouve actuellement toutes les conditions requises à son développement. Il est cependant possible d'attendre les premières manifestations de la maladie pour exécuter le premier traitement.

Sur les variétés hâtives, il est recommandé d'attendre la fin de la récolte.

On pourra utiliser : Doguadine (90 g) - Phaltane (100 g) - Manèbe (160 g) - Oxyquinoléate de cuivre (sauf en pépinière) (50 g). Doses exprimées en Matière active/hectolitre.

Si des traitements se justifient 8 à 15 jours avant la récolte, utiliser seulement la Doguadine.

PUCERON VERT DU PRUNIER

Une activité assez intense de Pucerons verts sur mirabelliers est observée dans le département de la Meuse. Après reconnaissance des colonies, intervenir avec l'un des produits aphicides recommandés sur la liste remise à chaque abonné.

RENOUVELLEMENT DES TRAITEMENTS APRES UNE FORTE PLUIE

Nous rappelons que les traitements conseillés par la Station doivent être renouvelés dès que possible après une pluie considérée comme ayant lessivé la dernière application, sans attendre un nouvel avis de notre part.

Tout traitement devrait être systématiquement renouvelé après une pluie d'orage égale ou supérieure à 25 m/m.

En cette période fortement orageuse, nous invitons nos abonnés à être attentifs à ce problème.

Le Responsable de la Station
d'Avertissements Agricoles :

C. GACHON

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux :

J. HARRANGER